

# Observations d'espèces rares ou nouvelles de Lépidoptères\* en Auvergne en 2009 (Lepidoptera)

Philippe Bachelard\* & François Fournier\*\*

\* *Le Monteillet F-63210 Olby*

\*\* *25 rue de la Treille F63000 Clermont-Ferrand*

L'année 2009 ne fut pas une année d'une très grande richesse entomologique et les données ne sont donc pas très nombreuses.

## ZYGAENIDAE

*Zygaena transalpina* ESPEL 1782. R MAZEL (2009) a repris l'étude du complexe *Z. transalpina/hippocrepidis*.

Il s'avère bien, comme l'avait autrefois suggéré Louis Faillie, que l'Auvergne abrite des populations hybrides. Une étude plus poussée serait intéressante à réaliser sur la région et il serait utile d'examiner des exemplaires d'origine différente (les populations les mieux connues sont celles des coteaux des Limagnes et vallées environnantes).

François Fournier est disposé à réaliser les génitalia d'exemplaires auvergnats pour continuer cette étude.

*Zygaena osterodensis* REISS, 1926  
Le Falgoux (Cantal) le 4 juillet  
(B. S.)

## PYRALIDAE

2763 – *Laodamia faecella* (ZELLER, 1839). Saint-Ours, le 18 août 2009 (F. F.).

2810 – *Lymphia chalybella* (EVERSMANN, 1844). Plusieurs exemplaires les 17, 18 juin 2009 dans les bois de la Comté : communes de Saint-Babel, Pignols, Sallèdes durant les prospections réalisées pendant l'étude d'IBISCA Auvergne sur les Lépidoptères. Nouvelle espèce pour le Puy-de-Dôme.

## HESPERIIDAE

3278 – *Pyrgus onopordi* (RAMBUR, [1839]). Ternant les Eaux (Puy-de-Dôme) le 4 octobre 2009. Espèce peu fréquente dans le département, à noter sa confirmation en Haute-

Loire un exemplaire trouvé à Léotoing le 4 septembre 2007 (F. F.).

## PAPILIONIDAE

3292 - *Parnassius apollo* (L.1758)

ROGER BOVAER a comme d'habitude parcouru la région pour étudier l'évolution des populations de *Parnassius apollo* auvergnats.

Dans le Cantal quelques populations encore importantes ont été observées à Sainte-Anastasia au rocher de Cuze, Houade rocher du Bertail, Aubusson rocher de Combières, La Falgoux la Peubrelie, mais beaucoup de sites connus ne possèdent que des populations très réduites ou même aucune observation.

Pour le Puy-de-Dôme le constat est pire en dehors d'une colonie importante au dessus de Super-Besse et celle du Puy-de-Dôme, les autres sites connus sont quasi déserts.

Cantal : Condat : Pt des Moines, 3 mâles observés après plusieurs années de non observation.

Sainte-Anastasia : rocher de Cuze, une quarantaine d'exemplaires

Houade : rocher du Bertail : une quarantaine d'exemplaires

Aubusson : rocher de Combières : une quinzaine d'exemplaires.

Le Falgoux : La Peubrelie, une quinzaine d'exemplaires dont 1 mâle (wiscotoïde ?).

Séгур les Villas : la Carrière : 1 seul spécimen en voie d'extinction

Puy de la Poche : 2 exemplaires en voie d'extinction

Dienne : rocher de la Gréze, 1 seule observation, en voie d'extinction

Puy-de-Dôme : puy de Pailleret : 2 exemplaires en voie d'extinction

Super-Besse : La cascade : une quarantaine d'exemplaires.

Puy de Dôme : chemin des Muletiers, en 1 heure, une trentaine d'exemplaires le 30 juillet.

3293 - *Parnassius mnemosyne montdorensis* (Kolar,1943)

Plusieurs stations répertoriées par BRUNO SERRURIER :

Cantal : pied des orgues de Peyre-Grosse, 1030 m commune de Valette D 305, sortie Est du bourg, 970 m commune de Chanterelle. le 24 mai.

Le Chomeil, 1030 m Eglise-neuve-d'Entraigues le 24 mai

Puy-de-Dôme : D 72, 835 m (entre Chez Maurissoux et Le Bouhet), Aulhat (800 m) commune de Larodde du 22 mai au 4 juin.

## LYCAENIDAE

3327 - *Thecla betulae* (L.,1758).

Espèce toujours discrète et souvent en petit nombre : une femelle observée le 26 septembre à Brenat, une autre à Solignat au puy d'Ysson le 3 octobre 2009 et à Boudes toujours dans le Puy-de-Dôme le 4 octobre ; plusieurs femelles le 13 septembre à Léotoing (Haute-Loire) (F. F.). 3347–*Everesalcetas* (HOFFMANNSEGG, 1804). Continuant son expansion il a été encore observé dans le département de l'Allier, sur la commune de Coutansouze, entre Bellenave et Montmarault. (B. D.).

3354d – *Phangeris rebeli* (HIRSCHKE, 1904). Quelques œufs ont été trouvés (F. F.) sur un plan isolé de *Gentiana cruciata* vers Champaix sur la D 629, ce qui confirme une donnée de S. Delmas des environs de Champaix qui n'avait pas été retrouvée lors des recherches pour l'atlas des Papillons du Puy-de-Dôme. De nouvelles recherches sur la plateau de Vichel se sont maheureusement révélées négatives, ce qui semble confirmer la disparition de l'espèce de ce site où il était abondant il y a encore une quarantaine d'années.

### NYMPHALIDAE

*Erebia neoridas* (BOISDUVAL, 1828) Blesle (Haute-Loire) bord de la D 8, Saint- Etienne-sur-Blesle D 83 Solignat le 30 août (B.S.).

### GEOMETRIDAE

3690 – *Orthonama obstipata* (FABRICIUS, 1794). Brenat (Puy-de-Dôme) le 4 juillet 2009, espèce rarement citée du département et dont la présence dans un jardin est un peu étonnante (F. F.).

3691 – *Xanthorhoe biriviata* (BORKHAUSEN, 1794). Le Mont-Dore 31 juillet 2009 et La Roche-Blanche Gergovie (Puy-de-Dôme) ce qui est beaucoup plus surprenant étant donné le type biotope, Brenat (Puy-de-Dôme) le 21 mai 2009 (F. F.).

3757 – *Thera juniperata* (L., 1758). Plusieurs exemplaires le 31 octobre sur un coteau au dessus de Clémensat (Puy-de-Dôme). Espèce citée une seule fois du département à Boudes en 2006 (F. F.).

3957 – *Stegania cararia* (HÜBNER, 1790). Nonette (Puy de Dôme) le 23 mai 2009. L'habitat est curieux car c'est sur un coteau sec au dessus de l'Allier que l'exemplaire a été découvert (F. F.). Cette espèce réputée peu fréquente s'observe généralement dans les bois humides.

3981 – *Cepphis advenaria* (HÜBNER, [1799]). Bois de la Comté le 29 mai 2009 sur la commune de Pignols. Espèce récoltée dans le cadre de la deuxième phase du



*Cucullia tanacetii* D. & S. chenille et imago Brenat  
(Clichés F. Fournier).

projet IBISCA Auvergne sur les Lépidoptères. Espèce rarement citée du Puy-de-Dôme.

## NOCTUIDAE

4284 - *Schrankia taenialis* (Hübner, [1809]). Bois de la Comté 16 au 19 juin plusieurs exemplaires sur les communes de Pignols, Saint-Babel, Sallèdes Espèce récoltée dans le cadre de la deuxième phase du projet IBISCA Auvergne sur les Lépidoptères.

Cette espèce, très peu citée, avait déjà été observée dans ce même bois sur la commune d'Yronde-et-Buron (F. F., 2002).

4360 - *Eublemma ostrina* (HÜBNER, [1808]). Brenat (Puy-de-Dôme) le 21 mai 2009, espèce peu citée du département (F. F.).

4361 - *Eublemma parva* (HÜBNER, [1808]). Léotoing (Haute-Loire) le 2 août 2009, Brenat (Puy-de-Dôme) le 21 mai 2009. (F. F.)

4607 - *Cucullia tanacetii* (D. & S., 1775). Brenat (Puy-de-Dôme), plusieurs chenilles au dernier stade le 5 juillet 2009 sur des achillées cultivées, émergence des imagos le 2 août 2009 (F. F.).

4755 - *Phlogophora scita* (Hübner, 1790). Le Mont Dore route forestière de Durbize. (FF).

Remerciements à Bruno Dauger (B. D.), Roger Bovaer (R. B.), Bruno Serrurier (B. S.) pour la communication de leurs données.

## Références

MAZEL R. 2009. - Le contact entre deux « bad species » *Zygaena transalpina* ESPER 1781 et *Z. hippocrepidis* HÜBNER, 1796 en France et dans quelques contrées limitrophes (Lepidoptera, Zygaenidae). R.A.R.E. XVIII, (2), pp 54-70.

BACHELARD P & FOURNIER F., 2008. - Papillons du Puy-de-Dôme, atlas écologique des Rhopalocères et Zygènes. *Édition Revoir*, 232 p.

Page de droite en haut :  
*Thecla betulae* L.  
 Léotoing Haute-Loire.  
 en bas :  
*Thera juniperata* L.  
 Clémensat  
 (clichés F. Fournier).

