

## ■ Cerambycidae nouveaux ou rares pour le Puy-de-Dôme.

Lionel DESBORDES

129, avenue de Royat 63 400 Chamalières

---

### *Pidonia lurida* (Fabricius, 1792)

Cette espèce est rare dans le Puy-de-Dôme où elle semble restreinte au massif du Sancy. Signalée du Mont-Dore (18/06/1996 F. Lacoste) et de la vallée de Chaudefour (22/07/2001, B. Calmont), je l'ai prise au col du Guéry (alt. 1260m) le 9 juillet 2006.

### *Cordotera femorata* (Fabricius, 1787)

Cette espèce montagnarde est rare en France où elle occupe essentiellement les Alpes. Nouvelle pour le Puy-de-Dôme, je l'ai prise à Clermont-Ferrand (Parc de Monjuzet) bien planté en conifères auxquels *C. femorata* est inféodé. Malgré tout d'autres captures devront confirmer sa présence dans notre région.

### *Cordotera humeralis* (Schaller, 1783)

Moins rare que *C. femorata*, *C. humeralis* reste peu commun dans notre région. Signalé de Peshadoire (B. Calmont, 29/05/2001), je l'ai capturé à deux reprises :

- ✦ Le 06 juin 2006 à Ceyrat (gorges humides de l'Artière, bordées de forêt mixte)

- ✦ Le 26 juin 2004 à Lempdes (Puy de bane, pinède sur coteaux secs).

A Ceyrat il s'agit de la forme suturalis à élytres fauves, alors qu'à Lempdes il s'agit de la forme typique à élytres noirs. Inféodé aux chênes et aux rosacées, les biotopes fort différents où les deux formes ont été rencontrées me condui-



▲ *Anaglyptus mysticus*

▼ *Pidonia lurida*



sent à m'interroger sur leur statut exact. Une étude de plus grande ampleur accompagnée d'autres captures serait intéressante pour préciser leur statut et leur écologie.

*Obrium cantharinum* (Linné, 1767)

Cette espèce floricole est inféodée aux Salix et surtout aux Populus. Assez rare en France, elle est nouvelle pour le Puy-de-Dôme. Je l'ai capturé à Beaumont le 23 juin 2006 sur les bords de l'Artière où saules et peupliers sont abondants .

*Callidium aeneum* (Degeer, 1775)

Trouvée pour la première fois en 2004 dans le livradois (L.Desbordes) cette espèce confirme sa présence dans notre région. Je l'ai capturé à Ceyrat dans les gorges de l'Artière le 6 juin 2006 sur une vieille grume de conifère.

**AUTRES CAPTURES INTÉRESSANTES**

*Oberea pupillata* (Gyllenhal, 1817)

Lempdes au Puy de bane le 16 juin 2006 par battage sur Lonicera.

*Anaglyptus mysticus* (Linné, 1758)

Durtol sur grume de Quercus le 12 juin 2006.

*Phytocia icterica* (Shaller, 1783)

Beaumont sur les bords de l'Artière le 28 juin 2006 confirmant sa présence (déjà observée le 28/06/2006, L. Desbordes).

CALMONT B. (2002). Quelques espèces de Cérambycides intéressantes pour le département du Puy-de-Dôme capturées au cours de l'année 2001. *Arvernis* 21-22 :57.

LACOSTE F. (2004). Contribution à l'inventaire des Cérambycides du Puy-de-Dôme. *Arvernis* 31-32 :24-25.

DESBORDES L. (2004). Observations en 2004 de Coléoptères nouveaux ou rares pour le Puy-de-Dôme (Buprestidae, Cerambycidae, Scarabeidae). *Arvernis* 31-32 : 31-32.