

## ■ Un après-midi fructueux

(Coleoptera : Cerambycidae)

Frédéric LACOSTE\*

\* 19 rue Pablo Neruda, F-63000 CLERMONT-FERRAND <fredericlacoste2@wanadoo.fr>

---

EN CETTE SAISON entomologique 2005, j'avais décidé de prospecter les bords de l'Ambène sur la commune d'Enval (Puy-de-Dôme). Ma première prospection a eu lieu le 14 juin après-midi par un temps maussade faisant suite aux pluies abondantes des jours précédents, et c'est donc sans trop de conviction que je commençais mes investigations. Mais très rapidement, je me suis aperçu de la richesse en longicornes d'une petite prairie en bordure de la rivière à proximité du village de *Beaurvaleix*.

Cette prairie, essentiellement composée de hautes graminées avec de nombreuses ombellifères et scabieuses en pleines floraisons, est bordée par des feuillus (noisetiers, peupliers, chênes principalement) associés à des ronces, viornes et sureaux.

La majorité des captures se sont faites à vue sur les ombellifères. Lorsque ces conditions ont été différentes, elles sont précisées dans la liste ci-dessous.

- *Rhagium mordax* (Degeer) : Plusieurs exemplaires au battage des viornes ;
- *Dinoptera collaris* (L.) : Un exemplaire au battage ;
- *Grammoptera ruficornis* (Fabricius) : Très abondant ;
- *Anastrangalia dubia* (Scopoli) : Peu abondant ;
- *Anoplodera rufipes* (Schaller) : Un seul individu ;
- *Anoplodera sexguttata* (Fabricius) : Un seul individu ;
- *Pachytodes cerambyciformis* (Schrank) : Abondant ;
- *Alosterna tabacicolor* (Degeer) : Abondant ;
- *Obrium brunneum* (Fabricius) : Abondant ;
- *Deilus fugax* (Olivier) : Abondant ;
- *Clytus arietis* (L.) : Plusieurs exemplaires au battage des viornes ;
- *Chlorophorus figuratus* (Scopoli) : Un seul exemplaire ;

- *Anaglyptus mysticus* (L.) : Un seul individu sur la même ombellifère que le précédent ;
- *Agapanthia villosoviridescens* (Degeer) : Une capture ;
- *Agapanthia violacea* (Fabricius) : Plusieurs exemplaires sur des scabieuses ;
- *Morimus asper* (Sulzer) : Trois mâles sur des troncs abattus de peupliers ;
- *Saperda populnea* (L.) : Posé sur une feuille d'ortie au pied d'un peuplier ;
- *Phytoecia cylindrica* (L.) : Un exemplaire capturé à vue dans la végétation herbacée en lisière de la prairie.

En une heure de temps à peine, ce sont 18 espèces qui ont été capturées dont certaines peu communes, comme *A. mysticus* et *P. cylindrica*.

Plein d'espoir de nouvelles captures, le lendemain, avec un beau soleil, je retournais sur le site. Hélas, à ma grande surprise, en 24 heures les espèces étaient beaucoup moins nombreuses en quantité et en nombre d'individus. Seules les espèces en gras dans la liste ont été observées de nouveaux, auxquelles il faut rajouter *Leptura maculata* (Poda), *Stenopterus rufus* (L.) et *Calamobius filum* (Rossi). □

