

■ Confirmation de la présence dans le Cantal de *Mellicta deione* (Geyer, 1832) (Lepidoptera, Nymphalidae)

Daniel TOURLAN

31, avenue du Général-Leclerc, F15130 Arpajon-sur-Cère

L'UNIQUE citation de cette espèce dans le Cantal remonte à 1949. C'est H. de Lesse qui a signalé sa présence dans les gorges de l'Alagnon, à quelques kilomètres en amont de Molompize (Revue française de Lépidoptérologie XII, 2).

Depuis de nombreuses années j'ai recherché en vain cette espèce dans le département en chassant systématiquement toutes les espèces d'aspect similaire et ce sont *Mellicta athalia* ou *parthenoides* que je récoltais. Le 13 août 2006, près du lieu dit « La Planche-du-Souq » (commune de Boisset), dans la Châtaigneraie, d'un coup de filet sans conviction, je ramenaient un papillon qui pouvait bien être l'espèce recherchée. C'était une femelle que j'étais le soir même et qui correspondait parfaitement à la description de *M. deione*.

Pour être absolument certain de la détermination il fallait récolter l'autre sexe et c'est pour cette raison que le lendemain en compagnie de Bernard et Alexandre Delassise nous avons recherché et pris plusieurs autres exemplaires, surtout des mâles dont la préparation des genitalia a confirmé qu'il s'agissait bien de *M. deione*.

Compte tenu de leur date de capture il s'agit probablement d'exemplaires de la deuxième génération.

L'espèce vole au bord des routes départementales 17 et 61 qui longent les vallées de la Rance et du ruisseau de Moulègre, sur les communes de Saint-Etienne-de-Maurs et Boisset, à une altitude comprise entre 300 et 400 m.

Malgré l'abondance de sa plante hôte, *Linaria repens*, qui pousse plus particulièrement dans les endroits rocaillieux, *M. deione* est très localisée et exige pour se développer des biotopes plutôt xéro-thermophiles. Elle semble absente des formations sédimentaires et volcaniques, et si l'on établit un parallèle entre les vallées de l'Alagnon, d'où l'a signalée de Lesse en 1949 et celle de la Rance et du Moulègre, on remarquera que ces deux vallées, très encaissées coulent l'une et l'autre à travers les formations métamorphiques du vieux socle hercynien et qu'elles ont été toutes deux épargnées par l'érosion glaciaire.

En Auvergne, elle est connue dans les départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme d'où elle vient d'être trouvée à Achat et paraît être très localisée partout.

FOURNIER F. & BACHELARD P., 2005 - Observations en 2005 d'espèces nouvelles ou peu connues en Auvergne (Lepidoptera). *Arvernsis*, 35-36 : 21-24.

LESSE H., 1949 - *Scolitantides orion* Pallas et quelques Rhopalocères du massif Central. *Revue française de Lépidoptérologie*, XII, 2 : 58-60.

SAVOUREY M., 2003 – la répartition en France de *Clossiana selene* (Denis & Schiffermüller, 1775) et de *Mellicta deione* (Geyer 1832). *Alexanor*, XXIII, 1 : 21- 42.