

Abondance exceptionnelle de *Gonepteryx cleopatra* L. en Auvergne en 2004



François FOURNIER*

* 25 rue de la Treille, 63000 CLERMONT-FERRAND

GONEPTERYX CLEOPATRA L. est une espèce à répartition méridionale, connue pour son caractère migratoire. Elle a été citée plusieurs fois dans le département du Puy-de-Dôme durant les cinquantes dernières années, mais aussi plus généralement en région Auvergne, par exemplaires isolés :

PUY-DE-DÔME

- Août 1952 : le Mont-Dore, Grande cascade ;
- 29 juillet 1963 : le Mont-Dore, Chemin des artistes ;
- 21 et 24 juillet 1963 : Besse-en-Chandesse (PLANEIX, 1963) ;
- Un exemplaire sans date précise capturé dans les environs de Saint-Germain-Lembron dans les années 1960 (*in coll.* Fournier) ;
- 1965 : un ex. à Saint-Anthème, au lieu-dit le Chomet (*obs.* C. Colomb) ;
- 1^{er} août 1970 : un ex. au Mont-Dore (ROUGEOT, 1971) ;
- Monts du Forez : nombreuses données (ROUGEOT, 1971) :
 - 1^{er} août 1962 : Pierre-sur-Haute ;
 - 28 juillet au 27 août 1970 : 30 ex. en particulier sur le versant du département de la Loire (Chalmazel, Fougère, Davoissienne) ;
 - cité des deux versants par BÉRARD (1971).
- 13 août 1980 : Saint-Victor-la-Rivière, à Bessoles (*obs.* P.-C. Rougeot) ;
- Juin 1984 : Saint-Gervais-d'Auvergne (*obs.* P. Duboc) ;
- 22 avril 1994 : Saulzet-le-Froid, à Pessade (*obs.* F. Fournier) ;
- 29 juillet 2003 : monts du Forez, entre Baracuchet et Sichard, un ex. (*obs.* C. COLOMB).

HAUTE-LOIRE

- 1962 : plateaux de la région de Pradelles (PLANEIX, 1963) ;
- Plusieurs données ont été rassemblées par C. Tautel (*comm. pers.*, 2004) :
 - Le Chambon-sur-Lignon, aux Vastres (*obs.* P. Sagnes) ;
 - 13 juillet 1973 : Vorey, à Vaunac JEANNIN (1984) ;
 - 29 juillet 1974 : Saint-Julien-Molhesabate (*obs.* R. Pupier) ;
 - 18 juin 1976 : col de la Croix de Peccata (*obs.* B. Joubert) ;
 - 10 juillet 1979 : Le Monastier-sur-Gazeille, à Chabriac, 19 juillet 1984 : Salettes, 13 juillet 1985 : Freycenet-la-Tour (*obs.* Sauce).
- 20 juillet 1982 : Brioude (MONTECOT, 1986).

CANTAL

- 1962 : région de Maurs (PLANEIX, 1963).

En 2004, un nombre relativement important d'observations de cette espèce a été réalisé dans notre région. Certains des exemplaires étaient d'une grande fraîcheur, ce qui pourrait témoigner d'une acclimatation provisoire de l'espèce. Cela peut être dû à l'effet de la canicule de l'année dernière qui aurait permis à des imagos de venir pondre dans certains biotopes, bien qu'un seul individu ait été observé en 2003 ? Mais des femelles ont pu passer inaperçues. Le devenir de ces populations reste à étudier à l'avenir.

Observations en 2004

PUY-DE-DÔME

- 14 juillet : un ex. à Dore-l'Église, vers le Verdelet (*obs.* C. Colomb) ;
- 15 juillet : un ex. au col de Dansadou (1090 m), un autre entre le col de Dansadou et Madeyrolles, le 15 juillet (*obs.* C. Colomb) ;
- 15 juillet : Mazoires, à la Jaquette (*obs.* P. Bachelard & T. Leroy) ;
- 22 juillet : même site (*obs.* T. Leroy) ;
- 31 juillet : un ex. à Chambon-sur-Lac, au puy de Surain (1450 m) (*obs.* F. Fournier) ;
- 2 août : un ex. à Saint-Germain-l'Herm, 2,5 km après le bourg sur la route de Saint-Alyre-d'Arlanc (*obs.* C. Colomb) ;
- 6 août : Saint-Nectaire, aux Granges (*obs.* T. Bernard) ;
- 11 août : un ex. à Églisolles (*obs.* C. Colomb) ;
- 28 août : un ex. à Novacelles (850 m) ; trois ex. sur deux sites différents à Saint-Sauveur-la-Sagne (820 m) ; un ex. à Saint-Alyre-d'Arlanc, au lieu-dit Trémoulet (855 m) (*obs.* F. Fournier) ;
- 4 septembre : un ex. à Achat, vers la cascade du Gour-d'Appat (715 m), un autre vers le Moulin de Pierre (750 m) (*obs.* F. Fournier) ;
- début septembre : observé de nouveau à Mazoires, à la Jaquette (*obs.* S. Oleszczyński).

CANTAL

- 21 juillet : Ségur-les-Villas (*obs.* B. Serrurier).

HAUTE-LOIRE

- Plusieurs observations ont été réalisées en juillet par D. Haubreux *et al.* :
 - Le 14 : un mâle à Saint-Bérain, à Chardassac ;
 - Le 15 : un mâle à Allègre, au mont Bar ;
 - Le 17 : deux mâles à Chanaleilles, à la montagne du Trou de Louve ;
 - Le 21 : quatre mâles à Chaudeyrolles, à la cascade de Matagot ;
 - Le 22 : un mâle à Saint-Victor-sur-Arlanc, à Cheyrac ;
 - Le 23 : un mâle à Chanaleilles, à la source de la Seuge.
- 10 juillet : un mâle à Saint-Julien-Chapteuil, à Rocherols (*obs.* M. Wersinger) ;

- 23 juillet : de nombreux mâles et femelles ont été observés autour d'un buddleia dans le bourg de Chanaleilles, observation également à la tourbière de la Seuge (*obs.* B. Serrurier) ;
- 9 septembre : un mâle aux Estables, sur le flanc de l'Alambre (1570 m) (*obs.* B. Gilard). □

Remerciements. – Je tiens à remercier C. Tautel pour son travail de recensement de données en Haute-Loire, C. Colomb pour ses observations du Livradois-Forez, B. Serrurier, T. Leroy, P. Bachelard, D. Haubreux et B. Gilard.

Références bibliographiques

- BÉRARD (R.), 1971. – Aspect zoogéographique du peuplement en Lépidoptères de la région forézienne. *Alexanor*, VII : 57-68, 101-112 et 169-178.
- BÉRARD (R.) & COLOMB (C.), 1997. – Inventaires faunistiques des monts du Forez : Lépidoptères, Rhopalocères, pyrales et macrohétérocères. *Bulletin de la Société des Sciences naturelles Loire-Forez*, 21 : 42 p.
- JEANNIN (A.), 1984. – Captures de Lépidoptères dans la région de la Haute-Loire. *Alexanor*, XIII : 243-250.
- MONTECOT (M.) 1986. – *Gonepteryx cleopatra* dans le nord de la Haute-Loire. *Bulletin des Sciences naturelles*, 52 : 2.
- PLANEIX (P.), 1963. – *Gonepteryx cleopatra* L. capturé dans les monts Dore. *Alexanor*, III : 165-166.
- ROUGEOT (P.-C), 1971. – Sur l'extension de *G. cleopatra* L. dans le Massif central en 1970. *Alexanor*, VII : 8.

• • •



D. Haubreux

Gonepteryx cleopatra
(mâle)

Narces de
Chaudeyrolles (43)
21 juillet 2004